

# When to Keep Your Child Home From School

## Coronavirus Infection Disease 2019 (COVID-19)

Children with a positive COVID-19 test or displaying symptoms of COVID-19 should stay home until they have had no fever for 24 hours without use of fever-reducing medication AND improvement of symptoms. It is recommended that added precautions are taken for the next 5 days, such as masking when around others.

## Chickenpox

Keep the child home until they have no new sores for 24 hours AND all sores are dried and crusted. During an outbreak of chickenpox, children who are NOT vaccinated for chickenpox (Varicella) and have been in close contact with someone sick with the infection will not be allowed at school for 21 days after they were last exposed to chickenpox, even if they are not sick.

## Diarrhea

Keep the child home until seen by a doctor and treated if needed. The school may request a doctor's note to return to school.

## Fever

Keep the child home with a temperature of 100.4 degrees or higher. Keep the child home until fever-free for 24 hours without using fever-reducing medicines such as Motrin and Tylenol. Contact your child's primary care physician and provide a doctor's note for their return to school.

## Flu-like symptoms

Sudden onset of fever, chills, muscle aches; may also have vomiting and diarrhea. Keep the child home until symptom-free for 24 hours. Contact your child's primary care physician and provide a doctor's note for their return to school.

## Head Lice

Keep the child home until treatment is completed and no eggs closer than 1/4 inch to the scalp and all live lice are gone.

## Vomiting

Keep the child home until no vomiting for 24 hours.

## Impetigo

Keep the child home for a **full 24 hours** after treatment has been started. Lesions must be covered while in school.

## MRSA

Keep the child home if the sore is draining, and cannot be covered with a clean, dry bandage. Keep the child home if they cannot keep from picking at sore.

## Rash

Keep the child home until seen by a doctor and treated if needed. The school may request a doctor's note to return to school.

## Strep throat

Keep the child home until 24 hours after the first dose of antibiotics has been started.

## Pink eye

Keep the child home until 24 hours after the first dose of antibiotics has been started.

## Ringworm

Keep the child home for a **full 24 hours** after treatment has been started. Area must remain covered at school until completely healed.

## Scabies

Keep the child home until treatment is completed.

## Abdominal Pain

Keep the child home with abdominal pain that continues for more than 2 hours.

## الأسباب التي تستدعي إبقاء الطفل في البيت و التغيب عن المدرسة

### الأمراض المعدية الناجمة عن فيروس كورونا ٢٠١٩ (كوفيد-١٩)

يجب على الأطفال الذين أنتت نتيجة فحوصاتهم إيجابية لفيروس كورونا و ظهرت عليهم أعراض كوفيد-١٩ البقاء في المنزل إلى أن يثبت اختفاء الحمى لمدة ٢٤ ساعة دون استخدام الأدوية الخافضة للحرارة وتحسن الأعراض. كما يوصى باتخاذ احتياطات إضافية خلال الأيام الخمسة التالية لذلك، مثل ارتداء الكمامة عند وجود الآخرين.

#### الجدري

إبقاء الطفل في المنزل إلى حين عدم ظهور قروح جديدة لمدة ٢٤ ساعة و إلى أن تجف جميع القروح و تقشر.  
خلال تقشي جدري الماء، لن يسمح للأطفال الذين لم يتم تطعيمهم لجدري الماء (فارسيللا) والذين كانوا على اتصال وثيق مع شخص مريض بالعدوى بالتواجد في المدرسة لمدة ٢١ يوماً بعد تعرضهم لجدري الماء، حتى لو لم يكونوا مرضى.

#### الإسهال

إبقاء الطفل المنزل في المنزل إلى أن تتم معالنته من قبل الطبيب و تلقي العلاج اللازم. قد تطلب المدرسة تقريراً طبياً قبل السماح للطالب بالعودة إلى المدرسة.

#### الحمى

الرجاء إبقاء الطفل في البيت إذا ما كان يعاني من حرارة تصل إلى درجة ١٠٠.٤ فهرنهايت أو أكثر. إبقاء الطفل في البيت لحين زوال الحرارة واستمرار زوالها لمدة ٢٤ ساعة دون استعمال أي أدوية خافضة للحرارة مثل الموترن أو التايلنول. الاتصال بطبيب الطفل و تزويد المدرسة بتقرير طبي مكتوب يفيد بسلامة عودة الطالب إلى المدرسة.

#### أعراض مشابهة لأعراض الأنفلونزا

ارتفاع حرارة مفاجئ، الشعور بالقشعريرة، الأم في العضلات، من الممكن أيضاً الإصابة بالإسهال والإقياء. يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على زوال العوارض السابقة دون تناول أي دواء. الاتصال بطبيب الطفل و تزويد المدرسة بتقرير طبي مكتوب يفيد بسلامة عودة الطالب إلى المدرسة.

#### قمل الرأس

إبقاء الطفل في المنزل حتى يكتمل العلاج ولا يقترب البيض من فروة الرأس بأكثر من 1/4 بوصة ويختفي جميع القمل الحي.

#### الإقياء

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة عليه دون إقياء.

#### القوباء

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ من بدء العلاج كما يجب أن تبقى المنطقة المصابة مغطاة أثناء التواجد في المدرسة.

#### عدوى البكتيريا العنقودية المقاومة للمثسلين

يجب أن يبقى الطفل في البيت إذا كانت القروح ملتهبة و متقيحة ولا يمكن تغطيتها بلاصقة طبية نظيفة و جافة. يجب أن يبقى الطفل في البيت إذا لم يكن بمقدوره التوقف عن حك القروح.

#### الطفح الجلدي

يجب أن يبقى الطفل في البيت لحين مراجعة الطبيب و تلقي العلاج إذا لزم الأمر من الممكن أن تطلب المدرسة تقرير من الطبيب قبل السماح للطفل بالعودة إلى المدرسة.

#### التهاب الحلق

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على تناول الجرعة الأولى من الدواء المضاد للإلتهاب.

#### التهاب باطن العين ( العين الوردية)

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ ساعة على تناول الجرعة الأولى من الدواء المضاد للإلتهاب.

#### القوباء الحلقية مرض جلدي

يجب إبقاء الطفل في البيت حتى مرور ٢٤ من بدء العلاج كما يجب أن تبقى المنطقة المصابة مغطاة أثناء التواجد في المدرسة حتى تلتئم تماما.

#### الجرب

يجب أن يبقى الطفل في البيت إلى أن يكتمل العلاج

#### الأم معوية

إبقاء الطفل في المنزل عند الشعور بألم في البطن يستمر لأكثر من ساعتين.